vota   Article 2e   2e Cayer

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
C N°

Du Charbon

Le charbon est une tumeur assez élevée inpudaire accompagnée d'une rougeur semblable a celle du sinabre et d'une douleur vive et pulsative sur le milieu de laquelle il s'eleve des vessies dessous lesquelles on sent une chaleur fort brulante et semblable a celle que feroit un charbon allumé. Les vessies estant crevées ou ouvertes on trouve la peau qui est dessous noire ou grisatre et gangrenée. Ces caracteres marquent que le charbon participe du phlegmon du skirre et de l'erisipelle. Voions comment il est produit.

De ce que dans cette tumeur il y a une elevation rougeur et une elevation considerable il faut conclure qu'elle est faite par le sang qui s'y est accumulé en grande quantité et la dureté qu'on y sent marque que le sang n'a pas sa fluidité ordinaire mais qu'il est epais et comme assez et comme la chaleur qu'il y a brulante et vive et brulante il faut que le sang epais ne fermente seulement pas beaucoup mais encore qu'il soit fort salé car il n'y a que cette constitution de sang qui puisse causer une chaleur cuisante comme nous avons dit en parlant de l'erisipelle. En effet il n'y a ordinairement que les melancoliques bruler dont le sang est sec, fort salin et grossier qui soit attaqué de cette tumeur. Ce sang donc sec salin et grossier venant a cet bouché le chemin dans quelque endroit y produit l'elevation la dureté et la douleur vive et pulsative et la chaleur cuisante et ravissant ainsi le corps muqueux il fait former des vessies qui contiennent une serosité chargée de beaucoup de sels de la nature de ceux du sang c'est a dire de sels corrosifs meslés, qu'elle mesle avec des autres eaux, pour lesquels tous ensemble forment un sel corrosif de la nature de l'eau regale qui ronge detruit et gangrene la peau qui est dessous.

Les causes qui sont propres a produire cette maladie sont toutes celles qui epaississent la masse du sang et qui enlevent les serositez entre autres la tristesse, le chagrin, la grande chaleur du soleil et les exercices immoderez et semblables comme nous avons dit.

Cette tumeur est assez facile a connoistre car d'abord qu'on voit une tumeur rouge tres douloureuse avec une chaleur fort cuisante et brulante on peut s'assurer que c'est un charbon.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 10
d. 13

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
N

Le Charbon est plus ou moins dangereux suivant les simptomes qui l'accompagnent celuy qui est sans fievre ce qui a rriue assez souvent dans ce pais n'est pas du tout dangereux celuy au contraire qui est accompagné de fievre est assez dangereux et plus si cette fievre est maligne ce qui arrive presque toujours

Le Charbon qui est au visage est fort dangereux parceque cet endroit est fort sensible et qu'il est a craindre que l'inflamation ne se comunique jusque au col et par consequent aux amigdales ce qui embarrasseroit fort ou intercepteroit entierement la respiration et deglutation celuy aussy qui ataque les extremites est fort perilleux parceque ces parties estant fort sensibles et cause des veilles continuelles et des reflux desprits dans toutes les parties du corps ce qui augmente beaucoup la fievre et les esprits venant a grand foule dans la partie ou se trouve le charbon ils ne manqueront pas dagiter beaucoup les sels corrosifs du sang qui est arreté lesquels par consequent detruiroient et rongeroient avec plus de force le tissu de la partie de plus cette grande quantite desprits qui se jette dans la partie affectée etrangleront beaucoup les vaisseaux et venant a les fomenter directement ses sels grossiers et corrosifs detruiroient et gangreneroient toute la partie

Dabord quon saperçoit de cette tumeur il faut saigner pour empecher la fluxion sur la partie tumefiée et sil ny a point de fievre on se [illegible] contenter a se purger simplement mais sil y a une fievre comme est presque toujours maligne on fera plus de saignées et lon purgera avec lemetique parce que ce remede nettoyera beaucoup les premieres voyes et vuidera copieusement les sels de la masse du sang on pourra suivre a de la manière qui est marquée dans les fievres malignes et produites par un sale venant beaucoup sur le fixe

Pour ce qui est des remedes externes il faut dabord ouvrir les vessies pour vuider la serosité corrosive et si la peau qui est dessous est gangrennée ce quon saura en la touchant avec le bout dune epingle il faut y apliquer le cautere pour emporter la partie gangrennée et on empeche que le mal ne se communique plus loing car les sels corrosifs de la partie gangrenée par la necessairement [illegible] agir sur la partie vive ni sinsinuer pour corrompre la liqueur qui si trouve n'y en s'unissant avec elle detruiroient le tissu de la partie et il faut avancer un peu le cautere sur les bords de la partie vive pour les emporter car les bords estant imbibés de la liqueur corrosive qui a gangrenné servant comme dune espece de filtre entour les sels corrosifs de la meme nature qui se trouvent dans la masse du sang se iettent pour gangrener les bords car la meme chose doit arriver presque dans les cauteres garçons aux

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE. C N

cas et aux jambes ou la substance de la partie estant emportée et les bords estant une fois imbibés d'une certaine humeur devient après de gout et de couleur savoir le tumeur analogue a celle qui imbibe la partie que quelque fois estant accoutumée auparavant d'estre jettée sur les yeux ou sur le poulmon et bouillent continuellement. Le escare estant faitte il ne faut pas la laisser tomber d'elle même comme on fait dans les autres escarres mais il faut la couper jusqu'au vif avec le scalpel et emporter dans le creux ou l'on a fait sauter la escarre on mettra le digestif emol. composé d'onguent d'althea et du beurre et sur la tumeur on mettra le cataplasme de mie de pain ou le cataplasme emol. decrit cy devant ou bien celuy qui se fait avec que les quatre farines et le miel pour ramolir la peau qui est extremement tendue dans ce cas. lorsqu'on voit qu'il y a une humidité qui commance a suinter des bords de cet endroit d'où on a tiré l'escarre c'est un tres bon signe car elle marque que la partie se degage et que la suppuration commance a se faire on mettra alors le digestif composé de therebentine de jaune d'oeuf ou de l'huille d'hypericum et sur la tumeur on mettra l'emplastre de mucilage et on arrousera de temps en temps la partie avec de l'eau de vie. L'esprit de vin mellé si l'on veut avec l'eau de chaux pour animer la partie. L'esprit de vin aussy en s'insinuant dans les parties adoucit un peu le sel corrosif qu'y se trouvent quand les chairs commancent a bien pousser on pensera la playe avec le mondificatif et si elles poussent trop et sont fongueuses on adioutera au mondificatif un peu de l'onguent d'apostol. et on lavera les chairs avec le vin ou l'eau de chaux lorsque le creux commancera d'estre bien remply de chair on y appliquera simplement de la charpy sec et sur la partie d'alentour on ne mettra que des compresses trempées dans le vin

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Article 3e

Des erisipelle charbonneux

L'erisipelle charbonneux a beaucoup de raport avec le charbon dont nous venons de parler et en effet c'est a raison de quelques simptomes du charbon qu'y se trouvent qu'il s'appelle erisipelle charbonneux. cette tumeur est d'une phlegmoneuse et beaucoup plus élevée que n'est l'erisipelle ord^re elle est beaucoup plus élevée que n'est l'erisipelle ordinaire elle est beaucoup plus ~~élevée~~ estendüe que n'est que le charbon simple il s'eleve plusieurs vessies sur la partie au lieu que dans le charbon il n'y a qu'une vessie qui est sur le milieu de la tumeur, la gangrene qui se trouve dans cette vessie fait beaucoup de progrès dans tres peu de temps et peut estre jusques dans la substance des muscles

ACADEMIE ROYALE DE C[illegible]

Comme dans cette tumeur la chaleur nest pas si brulante
que dans le charbon simple cest une marque que le sang qui y
est arete nest pas si salé et que le sel nont pas tant de
masse et la quantite de besser marque aussy que le sang ne s'y pas
fixé de maniere quil fournit une plus grande quantite de
serosité ; de plus la tumeur ne se trouvant pas si eleuée ny si
dure et la liqueur quy remplit le besser ne gangrenant
pas les parties qui en dessous cest un signe que le sel du
sang ne sont pas si grossiers ny si corrosifs que dans le
charbon simple

Ce qui donne ocasion a ces epanchements de sang dans le tissu
de la peau quy a raison de sa connextion particuliere fait
le charbon ensy elateux cest le gonflement des glandes miliaires
quy arrivent a locasion de sels grossiers et estrangers dans la
matiere de la transpiration et chargée par les fermentations irregulieres
et bisarres quils ont precede un sang aussy un peu plus crasse
qua lordinaire et fort salin pour sembarrasser dans les vaiss.
capillaires et entortilliés de la peau et si epanchant produira
tous les accidents qui sont particuliers a cette tumeur

Cette tumeur se connoit fort aisement par les simptomes dont
nous avons parlé si la fievre accompagne le erysipelle
charbonneux ce quy arrivey et que toujours on doit beaucoup craindre
puisque cette fievre est ordinairement maligne silny a point
de fievre il nest pas fort dangereux mais plus ou moins
suivant les endroits qu occupe celuy du visage est plus dangereux
que les autres parceque il ny a que fort peu de chair sous
la peau et que les os sont presque nud ou ne peut par consequent
et ronger si la gangrene y prend comme on fait dans les autres
endroits comme encore le nerfs du visage sont fort pres de leur
origine les afflux des esprits y sont vite et avec beaucoup de
biolence encore les nerfs estant tendus sur les os ils sont plus
faciles a estre ebranlez que ceux qui se trouvent dans des parties
molles et enfin comme nous avons desia ~~repete~~ souvent cette tumeur
du visage menace de l'inflamation du cerveau dautant plus grande
que les sels dans ce cas sont fort grossiers et corrosifs et le sang
un peu epaix celuy qui arrive dans les extremites aux genoux
et generallement dans les parties quy sont fort sensibles de
est assez dangereux parceque les violents afflux des esprits
quil produit aug^tent^ ou allument la fievre et embarrassent
plus le cours du sang dans la partie affectée

Pour guerir cette tumeur il faut saigner dabord
copieusement p^r^ empecher les humeurs de se jetter en grande sur la partie
tumefiée et par celuy redonner son tonus p^r^ chasser le sang qui y croupissoit

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

on saignera dom 7 a 8 et meme 10 fois suivant la douleur et
letendue de la tumeur et la violence de la fievre apres avoir bien
vuidé les vaisseaux comme les fomentations precedentes on forme
bcp de sel dans la masse du sang qui est produit cette tumeur il
faut tacher de le vuider ce quon faira par les purgations lesquelles
doivent estre tres forte ainsi la 1e fois on purgera avec lemetique
en trois doses parce quon en fort echauffé et que le sang en sec
et salin il faut repurger fort souvent mais sans emetique
on donnera des emulsions soir et matin et enfin on traittera
le malade come il est dit dans le traitté des fievres apres que la
fievre a passé il faut nourrir le malade tres legerement
et le tenir aux bouillons seuls parce que s'il mengeoit bcp
cela rendroit la guerison de la tumeur plus difficille

Pour les remedes externes il faut dabord ouvrir la tumeur
et si la gangrene nest pas bien avant il faut se contenter d'y
faire des irritations jusque au vif et on metra dessus un
supuratif anodin quon faira avec deux onces de terebentine
deux jaunes doeuf et une once donguent dalthea ou bien on peut
metre dessus pour faire supurer lhuille rosat qui est fort
adoucissante de meme que le baume darceus mais si ces remedes
ne font pas supurer et que lon connoisse que la gangr. est
profonde il faut y apliquer le cautere comme nous avons dit
dans le chapitre du charbon et separer dabord tout
ce qui est mortiffié des chairs mais si cette tumeur se trouve
aux paupieres ou dans quelque autre endroit ou lon doit craindre
d'aprofondir bcp dans lendroit quon veut cautoriser mais comme
le cautere est fort affoibly par la solution il faut l'apliquer
souvent sur la partie et ces ce qui demande car lon veut
aller icy doucement et bien voir tout ce que lon cautorise
il faut emporter surtout l'endroit qui est mortiffié de la partie
et dans lendroit ou lon a fait les escarre on metra le digestif
emolliant sur toute la tumeur dabord quon voit que les bords
de la playe commencent a se mundifier et on voit que la supuration
commance et on est hors de danger lorsque les chairs
commancent un peu a pousser il faut panser la playe
avec le mundificatif et si les chairs sont fongeuses il qui
arrive ordinairement on meslera un peu donguent
dapostol avec le mundicatif ou bien on y metra un peu de
verdet pour deterger plus puissament ou bien on lavera les
chairs fongeuses avec le vin chaud leau de chaux ou avec la
decoction de sommite dabsinthe et de petite centaurée de la
racine daristoloche des fleurs dipericum y adjoutes le miel du vin blanc
et on metra sur la partie dalentour des simples compres. trempées dans le vin chaud ou de

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

do m
mer

cette ocasion il ne faut jamais employer les emplastres si ce n'est au visage ou on en a besoin pour soutenir la paupiere si l'eresipelle charbonneux en a ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N il faut apliquer des cataplasme emoliens sur le col quy quelque fois par atague par la raison que nous avons aporté

article 4e

Du squirre phlegmoneux

Nous avons deja parlé assez au long du squirre et nous avons remarqué que son siege ord^re^ est dans les glandes conglobées et que la limphe s'epaissit et s'endurcit et s'il arrive que cette limphe s'arretant tout d'un coup dans la glande la gonfle subitement ou que estant arretée ou un peu epaissie elle prenne du mouvement et distend les glandes les vaisseaux sanguins d'alentour en seront beaucoup comprimés le sang par la tumeur son cours ordinaire considerablement embarassé s'arretera et s'epanchera tout alentour ce qui excitera une douleur considerable et une chaleur qui sont des caracteres du phlegmon ainsy nous appellerons cette sorte de tumeurs squirres phlegmoneux et on les voit arriver principalement au col a l'aisselle et a l'aine et comme ils demandent quelque chose de particulier pour leur guerison il faut qu'y en parler a part

Du Bubon

Le bubon est une tumeur dure ou squirreuse ordinairement avec inflamation et une douleur considerable et qui a son siege dans l'aine ou dans l'aiselle dire que cette tumeur se trouve toujours dans le meme endroit de l'aine ou de l'aisselle ou il y a beaucoup de glandes dans les sujets il faut conclure que c'est dans les glandes que la matiere de la tumeur est arretée et dire que la tumeur est dure il faut penser que c'est la limphe qui s'arrette dans les glandes les gonfle et s'endurcit si le gonflement des glandes se fait subitement il ne manquera pas de cause une inflamation comme il est dit cy dessus dans les bubons le gonflement des glandes est considerable et que le sang se trouve aussi arresté en quantité alentour il ne faut pas surprenant que la douleur soit fort grande car pour ce qui est des bubons qui arrivent aux aines comme ils se trouvent tout pres des aponevroses des muscles du bas ventre et des tendons des muscles qui flechissent la cuisse et qu'il y a encore quantité de nerfs qui traversent ces glandes et qu'il y en a d'autre fort considerable

ACADÉMIE DE CHIRURGIE

Couchées dessous il est de necessité qu'il excite des douleurs
les glandes aussy de laisselle estant tous prez
des nerfs bracheaux ne peuvent se gonfler et y cause une
inflamation sans en communiquer a la membrane et servir aux
des nerfs les quels en estant comprimés les esprits qui si trouvent
seront obligés de refluer avec violence vers le cerveau
et la douleur qu'il en sera produitte repondra jusqu'a l'extremité
du bras et de la main parce que les nerfs qui sont a ce quartier
estant comprimés a l'aisselle il en doit suivre les memes
impressions dans le cerveau que si ces nerfs estoient comprimés
dans le bras ou dans la main meme la meme chose se doit dire
des douleurs qu'on sent a la jambe a l'occasion du bubon de l'aine

Dans le bubon tant de l'aine que de l'aisselle non seulement
la partie d'alentour est gonflée mais encore toute l'extremité parce
que les vaisseaux limphatiques ne pouvant se vuider dans les
glandes de l'aine ou de l'aisselle a cause qu'elles sont bouchées et
gonflées la limphe est obligée de s'arreter dans les parties
et de les gonfler encore les glandes gonflées estant situées tout au
prez des troncs des veines qui raportent le sang des extremités
les compriment et le sang par consequent est obligé par la de
s'amasser plus qu'a l'ordinaire dans les extremités

Les causes qui donnent occasion au gonflement des glandes
sont les memes que nous avons raportées en parlant du skirre
encore le bubon de l'aine reconnoit une cause tout a fait
particuliere savoir le virus verolique lequel produit le
gonflement des glandes de l'aine ou ne passant point dans le sang
la limphe qui si trouve plus propre a s'arreter dans les glandes
que dans quelqu'autre ou bien le virus qui est melé avec la
semence qui est dans les vaisseaux deferens transpirant
a travers les tuniques de ces vaisseaux se mele avec la limphe
des glandes des aines qui sont tout pretz des vaisseaux deferens
et la coagule. Est le virus qui se trouve dans les serosités
que les femmes jettent qui passent a travers la peau de l'aine coagule
la limphe dans ces glandes de cette partie Le bubon est plus ou
moins dangereux suivant les differentes causes celuy qui depend
d'un virus verolique assez facheux parce qu'on ne peut pas
estre seur de la guerison que par la salivation Celuy qui est
sans fievre et qui n'est pas verolique est assez facile a
guerir mais s'il y a une fievre jointe il est le plus souvent
fort dangereux parce qu'elle est ordinairement maligne

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

Nous venons de dire que les bubons qui dependent du virus verolique se peuvent rarement guerir sans les frictions cependant si Le malade ne goutte pas ce remede il faut tacher de le guerir par les topiques. Or pourquoy si La douleur est grande il faut d'abord pour L'apaiser se servir du cataplasme de mie de pain cuit comme de lait se desseche et s'envoutte sur la peau quand on n'a pas le soing de le changer fort souvent et qui empeche son bon effet il vaut mieux se servir de l'autre cataplasme emol. apres s'estre servis trois ou 4 jours de ces remedes il faut tacher de resoudre ou faire venir a supuration la tumeur et pour cela il n'y a rien qui convienne mieux que le cataplasme qu'on fait avec la racine de bryone les feuilles de mauve de branc ursine et de parietaire avec la farine de lin et si apres s'estre servi de ces remedes durant deux ou trois jours on ne peut pas venir a bout de la resolution ou supuration de la tumeur il faut avoir recours a des remedes plus forts ainsi on fait un emplastre de galbanum dissout dans le vin qui par ses parties volatiles est bonne fort propre a mettre en mouvement la matiere arrestée dans la glande et bouche les pores et echauffe par les parties la matiere arretée on peut encore se servir de l'emplastre fait de galbanum et de gomme amoniac reduit en consistance d'emplastre par cato. l'huile des philosophes l'emplastre aussi de vigo mercure y convient bien si par ces remedes la tumeur commence a supurer on se servira de rechef du cataplasme emol. et on traittera l'ulcere comme nous dirons dans le chapitre des ulceres dans les parties glanduleuses si par ces remedes La tumeur ne se resout ny supure il faut sortir la cause il n'y a que les frictions qui la puissent guerir

Si La tumeur n'est pas verolique il faut se servir de memes remedes propres que nous avons ordonné pour le bubon verolique le meilleur resolutif qu'on puisse employer est le cataplasme ou entre la racine de bryone celuy aussi de galbanum et de gomme amoniac est preferable a ceux qui se trouvent dans les boutiques dont le meilleur sont celuy de Ranis de Diachilum cum Gummis et celuy de Cicuta si par ces remedes la tumeur ne se resout ou ne supure il ne faut pas porter outre car si l'on ouvroit la tumeur pour la faire supurer elle seroit fort longtemps a guerir et il viendroit des ulceres ou des fistules facheuses dans cet endroit

Des parotides

Les parotides sont des skirres et phlegmoneux qui vienent dans les glandes parotides dans les maxillaires inferieures ou dans les autres glandes voisines,

si cette tumeur n'est pas accompagnée de fievre on la guerit de la meme maniere que les bubons mais si elles survienent a une fievre maligne ce qu'on voit assez souvent sur la fin de ses fievres Lors qu'elle est eminente par bien il faut d'abord qu'on s'en aperçoit apliquer par dessus de la theriaque pour la resoudre quelqs fois l'eskirre est oedemateux et qu'en est encore pis alors on y met va demement de theriaq mais si apres s'estre servy deux ou trois jours de ce remede on voit que la tumeur ne diminue point il faut apliquer un cautere sur l'endroit le plus elevé de la tumeur soit qu'il y ait une suppuration ou non apres avoir l'eskarre on tachera de faire suppurer la tumeur car par la on peut esperer de faire passer par la suppuration une partie de la matiere arrettée pendant que le reste se resout et est resservé par les vaisseaux

La fievre n'y paroit fors souvent a mesure que les parotides aug. et la tumeur faisant retourner le sang il fermentera et fournira des sels grossiers qui allumeront la fievre qui tue le malade ordinairement

Article 8me

Des dartres

outre les differentes especes de erisipelles dont nous avons desja parlé on peut encore raporter a juste titre toutes les especes de dartres qui paroissent sur l'habitude de nostre corps dont il y en a quatre principallement et qui meritent une consideration particuliere

et 1. Lors qu'avec une petite elevation de la peau un rougeur et chaleur un peu plus grande que la naturelle il se trouve des vessies presque insensibles qui en se dessechant se separent comme des escailles ou comme de la farine avec une demangeaison on apelle cette espece de erisipelle dartre farineuse

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE C

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE

2° lors que sont les petites vessies qui s'elevent il se forment de croutes un peu epaisses qui ne sont enlevent pas beaucoup le tissu de la peau et qui se font sans demangeaison et sans aucun ecoulement de matiere on apelle cette dartre crustacée

3° si sous les vessies on voit des croutes qui sont volantes et se separent fort facilement laissant une impression ou creux considerable dans le tissu de la peau d'où il decoule beaucoup de serosité qui demange beaucoup et ronge considerablement le tissu de la peau rendent quelques fois les bords des ulceres calleux cette dartre s'apelle coulante ou rongeante

4° si le creux qui reste apres la croutte a tombé il decoule une serosité brulante et corrosive qui ronge les parties avec des douleurs considerables et qui rend les bords de l'ulcere calleux et fort elevés cette espece de dartre s'apelle chancreuse ou maligne.

Voila toutes les especes de dartre aux quelles on peut raporter toutes les autres puis qu'elles reconnoissent les memes causes et sont accompagnées de memes simptomes que celles dont nous venons de parler ainsy la dartre milliaire de quelques unes des especes que nous avons raportées que en ce qu'elles ne sont pas amasées dans le meme endroit mais les pustules sont une a une et parsemées ça et la ce qui ne suffit pas pour en faire espece distincte de dartres

Nous avons dit ci dessus que toutes les especes de dartres peuvent se raporter a l'erisipelle elles reconnoissent dont la meme cause generalle que l'erisipelle savoir une lymphe trop crasse qui faisant gonfler les glandes militaires embarasse le cours du sang et le fait epancher dans le tissu de la peau. et les differents simptomes qui caracterisent les differentes especes de dartre ne sont que les effets de cette cause generalle de l'erisipelle mais comme les simptomes sont differents dans ces differentes especes de dartre il faut aussi que le sang epanché qui est leur cause generalle soit donc constitué differemment dans les unes et dans les autres et pour la reconnoitre on n'a qu'a considerer attentivement la nature de ces simptomes

1° les petites vessies qui s'elevent dans la dartre farineuse reconnoissent la meme cause que celles de simple erisipelle et comme ces petites vessies se dessechent et se separent en forme de petites ecailles faisant paroitre la peau comme brullée sans qu'il reste aucune croute

Dessous estant creusé en aucune manière le tissu de la peau
il faut 1° que la serosité qui remplissoit auparavant les vessies
se soit evaporée car autrement elle ne se dessecheroient pas 2°
que cette serosité ait esté fort tenue et que puisquelle
s'est evaporée a travers la cuticule et quelle na laissé après elle
aucun sediment ou crasse pour faire une croutte 3° quelle n'est esté
chargée que de peu de sel et même fort divisé puisquelle
na excité que très peu de demangeaison et n'a pas rongé et creusé
la peau car elle n'a pu avoir de sels ni vers ni ou
ou embarrassés ou en tout divisés ou en fort petite quantité et
nous devons dire que cette serosité est fort tenue et dénuée
de parties sulphureuses qui empaisent embarrassent les sels.
il resulte donc que dans ce cas les sels sont fort divisés et en petite
quantité ce qui montre que la masse du sang qui est la source
de cette serosité n'est point salée ni gatée 2 on observe que
dans les autres surfaces les croutes sont epaisses et la peau
qui est dessous n'est pas rongée du tout ou au moins que fort
superficiellement d'où il faut conclure 1° que la serosité qui
remplit les vessies est un peu visqueuse et chargée de beaucoup de
parties sulphureuses que par leur operation dès que il y a eu
de plus tenu et de plus aqueux s'en est fait et se dessechant
en croutte 2° les sels de cette ciro[?] zitte n'agissent que peu
a peu ou point du tout sur les parties voisines ce qui vient de ce que
quoy quils soient assez grossiers ils sont pourtant meslés
avec tant de parties grossieres et soufrées quils sont comme
emoussés et ne peuvent faire aucun effort pour ronger la
substance de la peau cette serosité epaisse et visqueuse
indique une semblable constitution dans la masse du sang
3° Dans les autres rongeantes il n'y a que peu de croutte
la peau est beaucoup creusée et on sent beaucoup de demangeaison tout
cela marque que la serosité qui remplissoit la vessie
n'estoit que fort peu sulphureuse et peu en estat d'embarrasser
les sels salés corrosifs qui rongent et detruisent le tissu de la
partie ce qui supose aussy un sang fort salé et donc
une mauvaise constitution
4° par la meme raison il est clair aussi que dans les darbes
chancreuses les sels de la serosité sont fort debarrassés
et corrosifs et comme les bords de l'ulcere sont calleux et eslevés
il faut que le sel qui ronge et detruit le tissu de la partie
soit un sel tirant beaucoup sur l'acide qui coagule la lymphe
qui circule dans les bords de l'ulcere et ce qui les rend si
calleux et eslevés il faut aussy que ce sang dont cette

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C. N.

+

de changer cette constitution salée de la masse du sang il faut insister longtemps aux remedes

apres avoir pris les bouillons de vipere pend^t le tems que nous avons dit on viendra aux d^s layens et raffraichisans et mesme on s'en servira plustost si le malade est echauffé ce quy arrive ord^t mesme apres l'usage de l'acier ainsy on prendra des bouillons raifrichans qu'on fait avec la raine de chicorée les feuilles de laitue de bourache & aussy on prendra le petit lait colibé et ensuitte on viendra au lait d'anesse dans une livre duquel on mettra deux ou trois onces de suc de fumetaire et de la on passera a l'usage du lait de vache on peut pendant l'usage de ces remedes user des bains domestiques qui conviennent fort bien parce que l'eau relache ainsy le tissu de la peau donne un plus libre passage a la matiere de la transpiration entre l'eau d^t layens beaucoup le sel qui se trouvent dans les ulceres de la peau faict qu'il ne rongent pas et enfin s'il est necess. on peut recompenser l'usage de tous ces remedes et si la maladie resiste a tout cela il faut que le malade se reduise au lait pro omni alimento

pour ce qui est des remedes externes il ne faut pas s'en servir jusqu'a ce qu'on ait un peu adoucy la masse du sang par les remedes dessus car pendant que la masse du sang est gatée elle ne fournirait toujours de mauvaises humeurs a l'ulcere qui empecheroit le bon effet des topiques qu'on y appliqueroit si mesme l'on guerissoit les ulceres comme on empecheroit les mauvaises humeurs de se vuider par la elle gateroit encore la masse du sang et produiroit quelques maladies facheuses

L'indication qu'on doit se faire avant en se servant des remedes externes est d'adoucir de nettoyer et mondifier l'ulcere et de la cicatriser pour quoy la 1re chose qu'il faut faire est d'emporter les croutes parce qu'elles renferment les mauvaises humeurs et empeche qu'on y puisse employer des remedes propres et pour cette fin on appliquera dessus les feuilles de la patum auctum qu'on faira amortir sous les cendres ou bien on se servira de feuilles de beta alba legerement cuites dessous les cendres aussi les croutes sont inegales de sorte que ces feuilles ne peuvent s'y porter justem^t partout on broiera dans un mortier ces feuilles et on les appliquera en forme de liniment sur les croutes et si on adoute ces remedes ramollissent fortifie les croutes et les font tomber bien que quelquefois elles soient fort epaisses

pour ce quy est des autres fauineuses elles ne demandent point de topiques car apres s'estre servy des remedes internes cy dessus et du bain liquide elles passent d'elles mesmes il est bon aussi de les frotter avec la salive ou avec la crême

ACADÉMIE ... CHIRURG... C

ACADÉMIE DE CHIRURGIE C

Pour Les Crustacés apres avoir fais sauter le Croutte par Les remedes susd. on Les mondifiera et dessechera avec Longuent fait avec le poudre de la racine de lapatum acutum et d'helenium et le souffre ——

Mais dans les rongeantes apres que Les Croutes sont tombées il faut deterger l'ulcere et il n'y a rien qu'il le fasse mieux que l'huile de tartre car estant un peu caustique elle ronge les chairs baveuses et emporte les bords de l'ulcere qui serviroit de filtre aux mauvaises humeurs ensuitte pour adoucir un peu l'ardeur que ce remede a causé a la partie on se servira du baume d'arceus ensuitte il faut tacher de deterger et de mondiffier l'ulcere avec le liniment suivant.

℞ rad. lapat. acut. ℥vi helenii ℥ii fol. fumar. m. ii coq. in aceto fortissimo ad putrilaginem usque; pulp. traiect. add. ungt. alb. ℥i plumb. usti et litargir. ana ℥iii f. linimentum.

Mais si Les ulceres creusent beaucoup il faut au lieu de la quitta alba servir du precipité blanc ou de la poudre ferme qu'on trouve dans le col de matras lors qu'on fait le sublimé doux pour deterger suffisament lorsque L'ulcere est bien detergé et qu'on a envie de le dessecher on se servira des fleurs de souffre melées dans la pomade ordinaire ——

Si L'ulcere de la dartre est chancreux il n'y a que fort peu d'apparence de le pouvoir guerir car une partie estant une fois imbibée de sel du cancer il est presque impossible de la pouvoir reduire dans son estat naturel et si l'on se servoit de remedes sur son y attireroit une grande inflammation et en rongeant Les bords calleux on le faisoit ouvrir ce qui augmenteroit encore L'ulcere.

Pour guerir donc cette ulcere le plus seur remede seroit d'emporter Les bords calleux mais comme les ulceres chancreux servent d'une espece de filtre lorsqu'on les cicatrise la mauvaise humeur qui y estoit accoutumée de se separer restant dans le sang ne manque pas de produire des ulceres chancreux dans des autres parties ou quelques autres n'a a ... il faut donc mieux ne point toucher ces dartres et se servir simplement des remedes paliatifs se servant des Interieurs que nous avons prescrips cy dessus ainsi on avoira simplement en vue d'adoucir cet ulcere Chancreux c'est pour quoy on mettra dessus un liniment fait de deux onces d'huille d'oeuf ou d'huille d'amandes douces avec une once de poudre de plomb autant d'antimoine et demy once de chaux et si ces remedes irritent trop il faut se contenter d'y apliquer simplement l'huille d'oeuf ou d'amandes douces.

article 6

De la teigne

On peut encore ranger sous les dartres une espece de tumeur qui arrive le plus souvent aux enfans et que les latins appelent tinea ou favi et Les françois La teigne.

Lateigne est une tumeur qui commance par des tesses presque
insensible aux forsque de changement dans la peau le teste de dessous
l'on trouve dessous des croutes fort epaisses lesquelles estant levée on voit
des ulceres quy creusent beaucoup et sont des fistules et cen de la que cette
tumeur s'apelle ainsy mais ce qui distingue lateigne des autres estant
tumeurs cest que les croutes sont fort epaisses et justement de la couleur
de marsse de chene elle attaque tousjours la partie chevelue de la teste
le cheveux tombent.

ACADÉMIE ROYALE ... CH... C...

Voila toute ce quon remarque dans cette tumeur et comme nous avons
dit quelle atagne toujours la partie chevelue de la teste il faut que la
cause qui la produit soit particuliere a cet endroit car nous ne trouvons de
rien de particulier dans le tissu de la peau de la teste qui est le siege de ce mal
que la matiere qui se separe par les glandes miliaires laquelle est
fort considerable de celle qui se separe partout le reste de l'habitude
du corps puisquelle a une odeur plus forte que les autres et
beaucoup de crasse ce qui marque quelle est epaisse et visqueuse et
aussi la matiere de la transpiration estte en plus grande quantité
et plus longtemps sur la peau de la partie chevelue de la teste elle
peut boucher les tuyaux excretoires ou ronger la peau et ainsi
produire cette maladie outre dont que cette transpiration quy doit
se separer des glandes de la peau de la teste devient trop grossiere
elle s'arrestte dans les glandes miliaires de la teste et les gonflera
faira arrester en partie le sang qui circule a l'entour lequel
laissera separer la serosite qui passant atravers les fibres
sanira aux corps muqueux pour elever lepiderme en des petites
vessies il peut aussi y arriver que la matiere sarrestant dans la
glande la gonflera jusque la que ce quil y a de plus tenu passera
atravers les glandes et le tissu de la peau pour faire les vessies et
peut faire encore croire raisonable que la matiere epaisse qui
sarrete dans la glande venant a se mettre en mouvement et a se
rarefier par la chaleur du sang quy se trouve arrette tout a
l'entour rongera et detruira la glande et faira une petite
ulcere au fond de la peau quy fournira une serosite pour ronger
les parties voisines et faira des croutes on peut soubconner aussy
quil se peut faire un embarras dans la bulbe ou la matrice
des cheveux cette tumeur arrettée devenant corrosive ou donnant
ouvertures a un ulcere les racines des cheveux seront mangés ce quy les
faira tomber et le tissu de la peau sera rongé d'ou les ulceres
et les croutes mais si ce qui narrive a la bulbe des
cheveux nest pas la vre cause de cette maladie il arrivera
pourtant que l'humeur quy ronge le tissu de la peau
rongera aussi les poils quy passent atravers l'
en sorte que les bulbes des cheveux sont toutes mangées
soit que la cicatrice nouvelle quy se forme ne laisse
point de pores pour les cheveux il arrivera que les
cheveux ne pourront plus croitre et qu'on voit tout de
les jours lors que les ulceres sont bien profonds

ACADÉMIE ROYALE CHIRURGIE

Lors que Les parties Les plus ternes de Cette serosité quy remplit
Les vessies sont asevaporé tout ce qui reste sepaissira formera une
croutte et Lepiderme quy estoit Eleve en vessies se deichirant se
separera en forme decailles de Croutte sont fort epaisses qui montre
que la serosité qui Les formoit estoit fort Impure et chargée de bcp
de selz grossiés et dun peu de souffre parce que sil ny en avoit bcp
il seroit Impossible aux selz quoy que fort grossiers de rongerla
peau la creuser et se faire chemin Jusques au Crane meme quy se
carie quelque fois tout ce quil y a de facheux dans Cette tumeur est qu elle
est fort violent elle rend la teste fort puante fait tomber Les Cheveux
et comme elle supose un fort mauvais suport de la masse du sang don
elle depend elle est fort opiniatre et Creuse quelque fois jusques
aux os du crane quelle carie ce qui la rend bcp plus dangereuse
et difficille aguerir

Pour guerir Cette tumeur la 1re chose quon doit avoir en veue
est de corriger la masse du sang qui a fourny la matiere de la
teigne estant trop epaisse car avant on trouvera bien a guerir
Le ulcere puis que Le sang fourniroit tousiours une nouvelle teigne
Le ulcere comme Les 1ers meme si on tenoit
epaisse pour faire dautres ulceres comme Les 1ers meme si on tenoit
a les guerir cella pourroit attirer quelque nouvelle maladie co nome
nous dit en parlant des dartres et comme la teigne est une espece
de erisipelle on doit avoir la meme Indication se servant des memes
remedes Internes que dans les autres erisipelles ainsi tous les remedes
quon emploie doivent aboutir a dilayer Le selz du sang les briser et
attenuer et leur donner quelque volatilité pour pouvoir passer
sans aucune difficulté par leurs glandes et comme dans Cette tumeur
il ne se trouve point de fievre parce quelle se fait Lentement il nest
pas besoin de se presser beaucoup de saigner on se contentera donc de
saigner une ou deux fois pour mettre Le sang ou dans les vaisseaux
et donner lieux aux remedes quon doit emploier de fermenter et
raréfier Le sang sans aucune risque on viendra ensuitte a la sarsparèlle
decrite dans le Chapitre precedent apres cella on se servira de
bouillons aperitifs et des aposemes, de lopiatte dacier des bouillons de
vipere et des eaux minerales acidules aussy dont Les selz tiennent bcp
de la nature conviennent fort bien car elles lavent le sang et le dislayent
et brisant Les selz grossiers les emportent par Les urines ou les Intestins
et dilayent aussi la masse du sang

Apres avoir ainsi adoucy et retably la masse du sang on peut venir aux
topiques pour achever la guerison entiere des ulceres et pour Cella
quelques uns ne font simplement quarracher Les Cheveux par Le moyen
dun emplastre de poix de bourgogne qui ramollit un peu la
peau et deterge Les ulceres mais outre ce remede nest pas tousiours
il est tres douloureux cest pourquoy nous allons donner un moyen aussi seur
et Infiniment plus doux pour La guerison de ce mal et avant de

passer outre il faut avec des ciseaux couper tous les cheveux les plus pres de la peau quil est possible parcequ'ils embarassent beaucoup et quy empechent quon y aplique les remedes et sattachans aux Croutes empechent quelles ne tombent ; apres cella il faut tacher de faire tomber ces Croutes pour pouvoir penser les ulceres quy sont dessous et pour Cella on y apliquera des feuilles de beta amorties sous la cendre ou bien on broyera ces feuilles dans un mortier et on y mellera de l'huille rosat pour faire un cataplame quon apliquera sur les Croutes et renouvellera souvent pend. le jour les Croutes estans tombées on y apliquera pend. quelque jours sur les ulceres les feuilles de bette seules quy en ramolissent beaucoup la partie et ouvrant les pores font separer la matiere ce quy fait sortir toutes les mauvaises humeurs quy estoint dans les bords des ulceres co. aussi les chairs baveuses ensuitte pour detterger puissament les ulceres on y apliquera de plumaceaux trempés dans l'huille de tartre par defaillance mais si cette liqueur est trop forte on se servira de leau dans laquelle on aura fait bouillir deux parties de sel de tartre et une partie de fleurs de souffre ou bien on les arrousera simplement avec que leau de chaux bien chargée apres cella pour bien mondiffier l'ulcere on se servira de l'onguent avec que deux tiers de mondicatif de apio et une partie d'apostol. et lors que les chairs commenceront a remplir les creux et quils seront a les garnir on les pencera avec un onguent fait de trois parties de pompholigos et une ou demy de fleurs de souffre on lavera tous les jours avec leau de chaud- ou le vin chaud les parties ou les ulceres des environs pour emporter le reste des onguens et les crasse lors que les creux seront bien garnis de chairs pour les cicatriser on y apliquera da charpy sec au reste comme cette maladie est chronique et comme elle suppose un vice du sang difficille a corriger il faut pour empecher son retour que le malade prenne de tems en tems des remedes propres a attenuer le sang et a briser les sels co. sont les bouillons et lopiatte dont nous avons parlé

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE

article 8.

Du Panaris

Le panaris est une tumeur qui doit estre raporté au phlegmon mais qui participe un peu du squirre elle a son siege a la racine ou aux costés de l'ongle et comm.ce par une petite elevation dure sans grande douleur et sans aucun changement de couleur mais

Mais quoy que dans la suitte s'enflame et devien rouge extremement chaud et douloureux ce qui se termine pour l'ord.re en suppuration

De ce que cette tumeur au commancement sans aucun changement de couleur de la peau de la partie il est evident comme nous avons deja dit en parlant du thiorre que c'est la limphe qui la faitte et sur a la racine de l'ongle il n'y a que la peau nerveuse des tendons . . . .

Le perioste et le ligament de la derniere phalange il faut que ce soit dans quelqu'autre de ces parties que la limphe s'epaissit pour faire cette tumeur et comme elle est profonde et d'ailleurs qu'il se fait l'embarras ainsi mais dans quelqu'une des autres parties qui sont au dessus et dont nous avons parlé mais quoy que ces parties soit extrem.t sensibles et ne sent pas grande douleur au commancement parce que l'humeur ne s'y ramassent qu'insensiblement et que peu a peu ainsi la distention et la devulsion des fibres ne se font qu'insensiblem.t et par une suitte necessaire les reflux des esprits qui sont produit ne sont pas violent et par consequent la douleur ne doit pas estre grande mais comme a la fin cette limphe s'amasse dans ces parties a un tel point qu'elle comprime considerablem.t les veines estant comprimées ne peuvent pas recevoir le sang a proportion qu'il y est porté par les arteres il sera donc obligé de resallir sur les cotés des vaisseaux ne pouvant continuer son chemin en ligne droitte et par consequent il passe en plus grande quantité par les rameaux collateraux et comme quelques uns de ces rameaux se terminent a la peau elle recevra plus de sang qu'elle n'avoit auparavant et par conseq.t sera plus rouge d'autant plus que les veines qui en raportent le sang se trouvent un peu comprimées par la tumeur mais comme a la fin la compression des veines et des rameaux d'arteres est si considerable que les rameaux collateraux ne suffisent pas pour donner passage a tout le sang qui se porte dans les parties il sera obligé de s'accumuler ensuitte dans les arteres et les dilater jusques a lui creuser et se faire un chemin pour s'en avancer ou bien que dans ce temps la douleur doit estre tout a fait insupportable et pulsative parce que l'embarras et la distension de la partie se fait tout d'a coup et sur le cours du sang est presque entierem.t interrompu dans cette partie a chaque fois que le coeur y pousse de nouveau sang il doit resallir sur les cotés des arteres ne pouvant pas aller droit en avant et par conseq.t il doit augmenter la douleur en augmentant la distension et cette augm.on de douleur doit repondre aux contractions du coeur en ce quoy elle doulent pulsative la douleur doit estre d'autant plus grande dans ce cas que l'embarras se fait dans les tendons le ligamens ou perioste qui ayent leurs fibres extremement tendues sont en

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Estat de recevoir d'amoindrement et d'estre Communiquer avec violence aux Esprits qui y sont contenus mais si Cela doit arriver plustost dans le pericrane que dans les autres parties Cest parce que ces fibres sont extremement tendues sur la surface de los et y sont fortement atachez et par consequent si la moindre Inflamation les y arrive elle doit ~~exciter~~ une douleur Inconcevable cette grande douleur fait Couler Les Esprits en abondance dans la partie affectée Cette grande quantité desprits se melant avec le sang qui y est amassé lagitera bq? et fermentera Cette grande Chaleur et fermentation ne manquent pas dagir et de faire fermenter la Limphe epaisse qui se trouve arretée dans la partie tant la Limphe que Le Sang qui est arresté dans la partie doivent se pourrir et cest ~~effervesce~~ quoi doit arriver presque tous ~~les~~ tous les ~~jours~~ dans les panaris de plus comme Les influx des esprits qui sont une suitte des reflux violens qui se font de la partie affectée Jusque au cerveau ne se font pas seulement a la partie malade mais encore dans toutes les voisines il fait que Les fibres voisines se tendront du pericrane et de lo peau qui recoit quantité de nerfs doivent estre remplis plus qu'alord? et par Consequent Les vaisseaux Limphatiques et sanguins qui se trouvent en doivent estre etranglez et Le sang doit se pancher dautant plus ~~facilement~~ aisement q' se trouve fort raréfié par la quantité desprits qui si melent ce qui doit necessairement donner plus d'estendue a la tumeur Jusques a ce quelquefois elle n'occupe pas seulement tout Le doigt mais la main lavantbras et quelques fois meme tout le bras Jusqua lepaule

Longle tombe ordinairement apres cette tumeur parce que labcez se trouve Jusques a la racine de longle qui est lendroit ou elle recoit principallement la matiere de sa ~~nota~~ nourriture et de plus avoisement il ronge Les fibres qui y portent Cette Limphe La q'elle ne pouvant aller en allant ? son droit parce que tous les conduits sont rongez elle est obligée de sepancher dessous longle et de si epaissir mais comme cette matiere est poussée continuellement par celle qui vient apres elle est pareillement obligée de pousser sans Cesse longle Jusque a le faire a la fin entierement tomber et ainsi longle tombe de la meme maniere quelle salonge tous Les jours lors quil ny a point de douleur dans la partie

Cette tumeur Se Connoit facilement son principal caractere consiste a ce quelle a son siege a la racine de longle comme nous avons dit dans La description que nous en avons faitte

Le prognostic en est facheux puisquelle allume tous les jours La fievre par Les grandes douleurs et par Les sels fermentifs qui passent de la tumeur dans la masse du sang ainsi Les gens secz et bilieux risquent plus de cette tumeur que Les autres parce que leurs fibres

estant

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE

Estant plus seiches elles sont plus tendües et par consequent plus
en estat d'estre ebranlées vivement ce gens de plaisirs ont leur esprit
fort elastique et secz et font des reflux plus violents vers le cerveau
et ainsy il font des douleurs bien plus atroces et par consequent
l'estendue de la tumeur doit estre plus grande et la fievre plus
violente d'autant plus que le tissu de leur sang est aussi fort laché
il est facile de se mettre dans un grand mouvement de fermentation
d'ap... cette tumeur est dangereuse parce qu'elle est fort souvent suivie
de gangrene lorsque le sang du malade est mal constitué
et salin ce qui est commun a toutes les tumeurs phlegmoneuses
qui arrivent aux mains et aux pieds parce que la douleur estant
fort grande dans ces parties les esprits y influent en abondance
et si le sang qui y est arresté est salin il y fait une ebullition et se
rarefie grossierement et corrosif estant fort agité par la grande quantité
des esprits qui s'y meslent ils rongent et deschirent toutes les fibres
de la partie ainsi ils causent une gangrene

Pour guerir ce mal il faut bien saigner et y revenir souvent
et on prendra tous les remedes propres a prevenir tous les
mauvais effets de la fievre et la douleur dont nous avons parlé
dans le chapitre du phlegmon par ce qui est des remedes externes il
la 1re chose qu'il faut avoir en veue est de temperer la douleur ce qui
se fera avec le cataplasme de micapanis et comme il est a craindre
que la tumeur ne s'estende plus loing on peut mettre de l'oxicrat
sur la main et sur l'avant bras pour calmer un peu le mouvement
du sang qui s'y trouve affin que par son gonflement et rarefaction il ne
se bouche le chemin mais comme les vaisseaux sanguins
se trouvent un peu estranglés par la quantité des esprits qui entrent
dans les fibres de la peau nerveuse l'estranglement des vaisseaux et par
consequent au lieu de prevenir la tumeur il la causeroit et ainsy
il vaut mieux mettre sur toute la partie simplement le cataple
de micapanis apres avoir ainsi adoucy la tumeur il faut
songer uniquement de faire venir la tumeur a suppuration
parce que la matiere qui la faitte ne se resout presque
jamais ainsi si l'on voit que le cataple susd ne soit
pas suffisant pour faire supurer on se servira du suivant

℞ rad. brion. ℥iii fol. malu. pariet. betae et branch. ursin. āā m. i
coq. in s. q. aq. font. pulp. tritt. add. capas sub cineribus coctas
num. ii farin. lin. ℥ii f. cataplasma pro parte applicandum

on peut aussy se contenter de mettre sur la tumeur un peu de
levain et si tout cela ne suffit pas il faut venir a des remedes
plus

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C...

Plus efficace aussi on y apliquera un onguent de gomme armoniac galbanum et dabor quon voit La moindre chaleur

il faut sans balancer ouvrir La tumeur par deux raisons 1°

parcequelle diminue by la ~~douleur~~ tumeur car dans ce sorte de tumeurs Le pus nest jamais soluable parceque la tumeur en gatte pour les plus part de limphe qui ne fournit que du pus fort quon apelle sanie dont Les sels picotent rudement Les parties infectées et elle est ainsi affée par ce quelles sont de bar assez des parties sulphureuses 2° si ce pus est ainsi fort severe et se trouvant toujours dehors une manquera pas pour cela quil fasse quelque chose dans la partie de se faire jour Jusqualors dont il relachera les fibres et encore dans les fibres et y causera une carie ayant ouvert la tumeur on la pansera avec quelques digestifs doux tels et Le Baume darceus et ou Le suivant

℞ therebint. venet. ℥ii olei hyperic. et butiri recentis ana ℥i vitell. ovor. num. ii misce f. unguent. ad usum

apres que Les ulceres est un peu mondiffié on la pensera avec Le mundicatif de apio on le lavera tous les jours avec du vin rouge ou leau de vie et si les chairs sont fongueuses on Les basinera avec leau de chaux et on y fera degouter un peu de la teinture demirrhe et lors que la chair sera bien devenue et le vuide entierement rempli on y apliquera simplement du charpy sec pour la dessecher et la cicatriser

article huitième

On peut raporter a ceste sujelle une tumeur qui est commune aux enfans et qui consiste dans une petite elevation de la peau avec une rougeur une ardeur et une demangeaison considerable et qui se paroit tout dun coup

Il est que la tumeur est rouge il faut quelle soit faite par le sang mais comme elle est fort superficielle et quelle pousse des quelle a paru il faut que Le sang ne si arrete quen fort petite quantité et quil soit fort fluide et puisquon a une demangeaison il faut que Le sang laisse epancher de la serosité qui est ainsi chargée de sels picotant les parties car Le sel ne sauroit faire cet effet sil estoit dans le corps du sang meme parce quils seroient trop embarassés et envelopez de parties sulphureuses et ce le sel perd quil conserve sa volatillité et sa tenuité ordinaire ne picotte point Les parties et sevapore avec Les serosités et que de Lautre si Le sel estoit fort grossier il exciteroit une douleur et rongeroit Les parties Ce qui ne voit pas arriver dans cette tumeur il faut quil soit dans

un

ACADÉMIE ... DE ... CHIRURGIE

ACADEMIE ROYALE CHIRURGIE

h Cet estat moyen et qu'ils aient asses de masse pour y exciter la partie pour faire une demangeaison et assez d'humidite pour ne rongez parle pties et pour s'evaporer avec les serosites

Voicy ce qui peut arriver ainsi le sang pour l'obliger a la serosite hors comme le levain est fort superficielle dans cette tumeur on a assez de croire que la 1re cause de cette tumeur consiste dans l'embarras qui se fait dans le corps muqueux car ce corps estant cellula une espece de transpiration il faut croire que cette matiere arrestee dans les cellules du corps muqueux et les faisant gonfler pressent les vaisseaux sanguins et embarrassent ainsi le cours du sang pour donner une couleur rouge a la partie et pour faire un petit epanchement de serosite qui estant chargee de quelques sels un peu grossiers excitera une demangeaison mais le gonflement des cellules du corps muqueux n'est pas assez grand pour rompre les attaches de la cuticule avec la peau et pour faire des vessies il ne faut non seulement que le levain soit pres la cuticule et cette matiere fermentant d'abord elle se brise s'atenue, s'evapore et par consequent tout l'effet qui dependoit de sa grossierette [illegible]

Cod Nous venons de dire que cette tumeur est fort superficielle et occupe l'habitude du corps q'il y a une petite ardeur et rongeure et une demangeaison on voit quelle a quelque rapport a l'erisypelle cette tumeur se connoit fort facilement parce qu'elle est fort passagere elle ne dure pas plus d'un quart d'heure et revient souvent plusieurs fois dans un jour

Le prognostic si cette tumeur est sans fievre elle marque simplement un sang plus salé qu'il ne doit estre qui menace quelqu'autre maladie plus grande si elle est avec fievre elle est fort dangereuse non par sa cause mais comme signe d'un tres mauvais estat du sang et dans les fievres continues elle est presque toujours suivie d'un transport au cerveau ou de lire elle paroit souvent dans les fievres intermittentes principallement sur le commencement de l'acces parce qu'alors les levains sont grossiers et la fermentation qui suit les ayant brisés elle fait qu'ils ne s'arrestent point dans leurs couloirs dans les fievres elle est aussi un fort mauvais signe car le sang estant salé il menace de faire fluxion sur quelqu'une des parties internes cette tumeur peut estre mauvaise aussi en tant que cause parce que les ans produits par l'embarras qu'il fait dans le corps muqueux la matiere qui se doit separer par la

Estant obligée de regorger dans la masse y peut la fondre et Satiene avec les reiouvements elle les grossira et les rendra crasses regoyle fera reste dans les couloirs et faire ainsy une fluxion sur quelque autre de parties Internes

Pour guerir cette tumeur il faut saigner 2 ou 3 fois plus ou moins et s'il n'y a point de fievre il faut purger alors si le sang est fort ... il faut prendre de bouillons rafraichissans pendant 8 jours purgeant au milieu et a la fin ensuitte on viendra aux bouillons de ... aperitifs qu'on fera avec cerfeuil et l'aveau adjoutant a chaque bouillon une dragme de poudre de vipere et gr xx de poudre de cloporte apres l'usage de ces bouillons on prendra le petit lait et le laitentier pour retablir et adoucir la masse du sang.

il y a fievre quelle soit intermittente il faut saigner plus que a l'ordinaire et on prendra les diluyens et adoucissants et si la fievre est continue il faut aussy plus saigner et raffraichir et prendre tous les remedes propres a prevenir et combatre ... transport au cerveau et le delire

article neufiesme

Du Clou

on doit raporter au phlegmon une espece de tumeur qu'on apelle en latin furunculus et en francois clou ou furoncle cette tumeur commance par une pointe rouge dure douloureuse et asses elevée dans laquelle il se forme insensiblement une tumeur dure qui aquiert quelque fois la grosseur d'un oeuf. La pointe estant ouverte on trouve dedans une espece de matiere epaisse et glutineuse qui ressemble a une corde de boyeaux. Cette pointe n'a pas son siege dans la cuticule puis que quand on la presse on sent une resistance et une duretté dessous et lors qu'on ouvre la tumeur on trouve la matiere grossiere dans la peau que ce trouve le siege de cette tumeur on ne remarque pas autre chose dans la peau qu'un tissu de fibres et de glandes milliaires qui sont couchées dessous et comme les fibres de la peau ne se trouvent pas si propres a embarasser le cours des humeurs que les glandes on a raison de croire que c'est dans celles qui se trouvent l'embarras qui produit cette tumeur ce sentiment est confirmé par la figure de la tumeur qui se leve en pointe car si ces humeurs s'arrestent dans les fibres de la peau elles la feroient elever mais n'y formeroient aucune pareille pointe comme on voit dans cette tumeur. de plus lors que la tumeur s'ouvre et qu'on oste cette matiere qui se trouve on voit un vuide qui ne communique pas avec les parties voisines ce qui fait voir que la matiere estoit contenue dans une glande outre que les glandes ne peuvent pas ce gonfler pour faire une elevation particuliere dans cette boutée il faut donc quelle

Rétrecissement qui se fera par la ait a quis trop de Corps de consistance eravit si bouchent exactement les pores de la glande et oblige celuy qui aborde de nouveau de s'y arreter et s'accumulant ainsy peu a peu la glande se gonflera plus de volume et comprimera les vaisseaux sanguins le sang se trouvant ainsy plus qu'a l'ordinaire dans le tissu de la peau lui comunique beaucoup de rougeur et comme la tension se fera. il ne faut non seulement que les vaisseaux de la partie soint bien tendus mais encore que les humeurs qui les remplissent ait plus de consistance qu'a l'ordinaire car si l'humeur retenoit sa fluidité ordinaire la partie quoyque tendue ne seroit pas dure et n'auroit point de resistance comme on voit tous les jours qu'il arrive dans les phlegmons par le sang donc qui s'arrete a l'occasion des glandes miliaires a plus de consistance qu'a l'ordinaire mais si cette tumeur se forme lentement et qu'elle se guerit fort difficilement on a raison de croire que c'est la limphe qui a plus de part a la formation de cette tumeur estant l'humeur de notre corps qui a le plus de peine a suppurer. il faut donc voir ce que la limphe souffre et s'endurcit dans cette partie ce qu'on n'aura pas de peine a concevoir si l'on suppose ce qu'il est vray qu'une glande ne sauroit s'obstruer sans se gonfler ni se gonfler sans que les pores se dilatent les pores estant dilatés il ne laisseroit pas entrer leur revenement propre mais encore la limphe meme. cette limphe s'amassant insensiblement elle fera gonfler les glandes et changera sa nature passera la peau qui est dessus elle et la fait a elever en pointe puis qu'elle n'est pressée que dans le point savoir en celuy qui couvre la glande qui est gonflée et cette limphe se dessechant par la chaleur du sang qui s'y trouve ramassé en plus grande quantité qu'a l'ordinaire par la compression des vaisseaux elle rendra la tumeur dure et car cette limphe endurcie qui paroist co[mm]e une corde quand on ouvre la pointe et lorsqu'on oste toute ~~cette~~ limphe epaisse on trouve un vuide qui n'est autre chose que la capacité de la glande qui estoit remplie de la limphe epaisse mais comme ~~cette~~ tumeur et la durete dont elle est accompagnée ont beaucoup plus d'etendue qu'en a la pointe et la glande gonflée qui luy repond il faut qu'outre la limphe qui s'est arretée et endurcie dans la glande et qui fait l'essentiel de cette tumeur il faut dire qu'il ait une semblable humeur savoir une limphe arretée et endurcie autour de la glande gonflée ce qui est facile a concevoir car la peau n'estant pas fort sanguine naturellement et la limphe estant la principale humeur qui y arrose s'ensuit d'ordinaire que les glandes gonflées et le sang qui s'arrete par le gonflement de la glande peuvent bien arreter le cours de la limphe jusques a l'obliger de s'arreter dans le co[rps de la]

partie

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

L'autre comme dans cette partie il y a une chaleur considerable a raison de la quantité du sang qui s'y trouve amassé la lymphe ne sauroit y rester plus qu'a l'ordinaire sans que ce qu'il y a de plus tenu et de plus aqueux s'evapore et que le reste s'epaississe et s'endurcisse c'est cette grande quantité de lymphe et de sang qui s'arrete dans le tissu de la peau autour de la glande gonflée qui la rend si epaisse jusqu'a ce que quelquefois l'on s'epaisseur d'une pointe sauroit de la profondeur de la tumeur

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

Nous venons de prouver par des raisons assez convainquantes que c'est la lymphe qui contribue le plus a former cette tumeur la lymphe estant d'elle meme tout a fait impropre a fermenter ou a suppurer c'est la tumeur qui en est formée le devoit estre aussi mais quoyque cette tumeur soit faitte de la lymphe et qu'elle ne se forme que lentement elle est pourtant accompagnée d'une rougeur chaleur et douleur fort considerable ce qui paroit opposé a ce que nous avons dit en parlant du skirre mais cella paroitra fort raisonable si on fait reflexion que ces accidens ne se trouvent que dans la pointe ou autour de sa base et non pas dans le gros de la tumeur qui demeure longtemps a se former et ainsy la glande prenant subitement un accroissement violent la peau de la pointe elle distendra et comprimera fortement les vaisseaux sanguins d'ou il s'ensuivra une douleur considerable une rougeur et chaleur mais la douleur augmente beaucoup lorsque la tumeur tend a suppuration parceque les sels de la lymphe qui y grossissent et s'aigrissent par leur sejour de parties aqueuses font des impressions bien plus rudes et plus facheuses tour qu'ils viennent a se mettre en mouvement par la chaleur du sang qui fermente et commance a suppurer a l'entour que ne faisoit les sels du sang meme parce que ceux cy ne sont pas si massifs et estoient plus enveloppés de parties sulphureuses

Le prognostic de cette maladie n'a rien de facheux car elle ne suppose aucun mauvais estat dans le sang et quoyque ce soit une matière de la lymphe trop epaisse a l'occasion de laquelle cette tumeur s'est formée cette matière n'est pas pourtant epaisse partout si elle estoit on devroit avoir des tumeurs partout le corps ainsi il suffit que la matière qui se separe dans une partie qui soit viciée soit que cella vienne du hazard de la fermentation ou de quelque excez quoy qu'il en soit elle est ordinairement accompagnée d'inquietude et de veille et quelquefois mesme de fievre mais qu'il n'est pas dangereuse parcequ'elle depend uniquement de la douleur ce qui arrive aussi est dangereux parceque l'inflammation pouvoit se communiquer aux parties qui y sont contenues

Lorsque cette tumeur on n'a pas besoin de beaucoup de remedes interne et ainsi on se contentera de saigner une ou deux fois si l'on le trouve necessaire on purgera le 3 ou 4 jour la 1ere chose qu'on doit avoir en veue pour l'exterieur est d'apaiser la douleur et pour cella on appliquera sur la tumeur le cataplasme dont nous avons ou l'autre emol. que nous avons descrit dans le chap du phlegmon affin que relachant la peau on la rende moins sensible apres avoir un peu apaisé la douleur il faut tacher de faire suppurer la matière de la tumeur parce

quelle ne se resout jamais. et comme les cataplasme, sont souvent trop foibles pour donner assez de mouvement a la supuration pour la mener a supuration il faut avoir recours a de plus forts ainsy dans un cataplasme de levain ou bien d'oignons cuits sous la cendre ou enfin de basilicum avec du tabac et on metra dessus l'emplastre de diachilum dabord que la supuration commance a se faire il faut ouvrir la tumeur et la mettre bien a jour pour découvrir cette limphe epaissie qui remplit la glande ou les membranes qui contenoit la limphe epaissie mais com ordinairement on ne le sauroit emporter parce quelle tient avec les parties voisines par quelque fibre on mettra dessus un supuratif fait avec le basilicum et longuent d'althea ou bien on y metra du baume d'arceus et tous les jours avec les pincettes on tirera les membranes a la fin de les faire tomber en pourriture mais si cella ne suffit pas et quil y ait beaucoup de membranes on adioutera au supuratif un peu d'egyptiac pour les manger on continuera de meme sur les restes de la tumeur l'empl. de diachilum et on lavera la playe toutes les fois quon la pencera avec le vin rouge dabord que les membranes seront toutes consumées ou que la chaleur paroitra nette on pencera la playe avec le mondicatif d'apio et on continuera le reste de la guerison de la maniere ordinaire

article 10.

Du dragon

Le Dragon est une espece de (tumeur) assez commune aux Indes qui est une espece de clou carelle et forment de meme mais ce quelle a de particulier est que lors que la pointe s'ouvre il en sort une matiere resemble a un ver qui s'attache a un peu de cilindre et tous les jours on la tire en dehors et la tournant autour du cilindre et si cette matiere vient a se rompre avant que l'on l'ait entierement tirée, la tumeur s'enflame et devient fort facheuse et cette matiere qui sort en forme de ver qui a imposé aux Indiens et leur a fait apeler cette tumeur Dragon, mais si on y fait un peu de reflexion on verra que ce qu'ils prenent pour un ver n'est autre chose qu'une limphe epaissie et un peu endurcie qui est tout a fait de la nature de ce que nous avons apellé corde en parlant du clou et quoyque cette corde paroisse au fond de la partie et de bien loing elle ne vient pourtant que du dessus de la peau savoir des glandes miliaires il est vray que dans cette partie la peau est beaucoup plus epaisse qu'ailleurs comme nous avons expliqué en parlant du clou lorsqu'une glande ou plusieurs viennent a se boucher se gonfler et se generer elle laissera passer une limphe glutineuse et saline qui forme le commencement de cette corde il y a de nouvelles limphes qui s'atachent a celle a continue pend. plus. jours jusques a ce que l'on ait tari la source et que les glandes se generent et supurent mais si l'on vient a rompre cette corde.

ACADÉMIE ROYALLE DE CHIRURGIE
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

on sent bouce formal parce que le 1mier de la peau venan a la bouche. La lumière s'amasse en quantité dessous et embarrassant les vaisseaux de l'entour elle attire une inflamation et une fièvre parce que dans ce pais chaud les tumeurs sont fort disposées a ce mettre en mouvement pour guerir cette tumeur il faut faire une bonne ouverture pour pouvoir toucher les mauvaises glandes et l'on doit traitter la playe de la manière qu'ils traitent dans la ville de Alloa

article IIe

De la Galle

La galle doit estre raportée a le ris. jcelle est une maladie assez commune qui commence par une petite besse sans aucune chaleur ny rougeur avec une demangeaison assez facheuse ensuitte il se forme des goutttes qui estant tombées laissent dessous en eleve ou vient ensuitte une nouvelle goutte ce mal a beaucoup de rapport avec les dartes miliaires.

De ce que cette besse arrive sans chaleur ny rougeur de la peau on a raison de conclure que le vice n'est pas dans le tissu de la peau et si elle est quelquefois rongée et enflamée cela vient du gratement qu'on a fait dans qu'on a ja dechiré les fibres de la partie et que nous avons la besse on ait donne occasion a l'air exterieur a coaguler le sang dans le tissu de la peau et d'y faire une espece de flogose. le cas aussi qui sont le sel de la besse pourroient causer la meme chose.

La cause du mal est dans le corps muqueux. Car le corps muqueux ne peut causer cette besse qu'en occupant plus d'espace par son gonflement car la surface tant n'a pas plus de lieu puisque la chaleur de la partie n'est pas plus considerable. le corps muqueux ne sauroit se gonfler sans estre imbibé d'une matière etrangere qui lui est communiquée des parties voisines ou qu'elle peut y estre arrivée qui se separe continuellement par les glandes de cette partie et qui sort comme alors si arreste et gonflent les glandes. Ecartant la cuticule de la peau et rompant les fibres qui les attachent ensemble. Or le gonflement ne peut venir de 1o puis qu'il ny a aucun vice ny embarras dans les parties voisines qui pourroit donner occasion a la serosité de ce jetter dans le corps muqueux qui donne occasion au gonflement ou cette matière ne sauroit faire le gonflement sans que ou les emissaires qui la conduisent au delà de leur. Car a celle sont estranglés et condensés ou quelle meme art acquise plus de consistance les 2. peut bien ce faire car le froid y faisant resserer la surpeau doit bien estrangler les petits emissaires du corps muqueux aussy que ceux des glandes miliaires. Le froid peut aussi coaguler cette matière qui luy donne de la consistance dans les glandes meme du corps muqueux mais cette maladie arrive en toute saison et ceux qui ce garantissent de l'air aussi bien que ceux qui y sont continuellement exposés on a raison de croire que ordinairement la matière qui se separe par les corps muqueux aiant acquis trop de consistance et bouche le chemin et fait ainsi gonfler le corps muqueux. et ce qui confirme ce sentiment c'est que les gens qui sont des excès qui ont le sang crasse et salin et les enfans qui ont generallement les humeurs plus epaisses que les adultes et qui a raison de leur voracité sont plus sujets a des excès de bouche.

sont Le plus souvent attaqués de ce mal que Les autres ainsi si la
fermentation du sang ce ralentit et s'il y a de sels et de souffres grossiers
qui se meslent Les sels venant a s'unir ensemble s'atachent les uns et les
autres ils feroient plus souvent angles irreguliers ce qui les feroit
arrester dans le petits pores des glandes outre que les parties sulphureuses qui
viendroient au bout elles rempliroient les intervalles des glandes et feroient
obstruction par ce qui occupant entierement Le pore emissaire
de la glande obligeront celle glande gonfler.
Voila ce j'ay dicte cause generalle de la galle non pour tout d'autre
tous Les autres accidens que nous y avons remarqués mais avant de
passer outre il faut savoir qu'il y a deux especes de galle savoir la commune
ou Les vessies sont petites la demangeaison fort considerable sans croustes
et passe en peu de temps aussi elle dure elle causera un ulcere qui ne sera pas
en croutte L'autre est La grosse galle ou il y a des grandes croustes.
Or dece que dans la galle comme il y a une demangeaison considerable il faut
que la serosité qui remplit Les vessies soit chargée de beaucoup de sels car
il n'y a que Les sels qui peuvent picoter et que Les sels n'ont assez de
masse non pas pour exciter une douleur mais toujours plus qu'il ne faut
pour faire un sentiment ordinaire car la demangeaison tient un
estat moyen entre douleur et Le sentiment ordinaire mais elle participe
beaucoup de la [illegible] et quelque fois elle est aussi incommode que la
douleur meme cette douleur nous oblige a gratter La partie et la frotter
affin d'emporter Le corps qui nous incommode mais si qu'il si on ne
le gratte que peu on se trouve soulagé parce que par Le mouvement
qu'on communiques aux humeurs on en fait envoler une partie et L'on
divise Les sels de celle qui reste ce qui Les rend moins propres a
picoter La partie d'ailleurs en comprimant les parties et glandes voisines
on fait separer beaucoup d'humeur d'une nouvelle humeur et comme
elle l'est plus chargée d'eau que L'autre elle doit estre moins propre
a picoter La partie mais si L'on se gratigne Longtemps on augmentera
La douleur par La raison parce qu'en rafraichissant Le corps on augmente
Les vessies souvent mais on Les emporte et on laisse La peau toutte nue
a l'injure de l'air on meurtrit encore Les fibres et on fait epancher du
sang.
La vessie qui se leve dans la galle comme n'est pas suivie de croutte
a qui marque que L'humeur qui estoit au dedans n'estoit guere
sulphureuse parce qu'apres qu'elle s'est evaporée elle ne laisse aucun
sediment pour faire une croutte et comme L'humeur s'evapore assez vite elle
ne doit pas ronger La peau et si par hazard elle La ronge L'ulcere
ne doit pas estre couvert de croutte par que la serosité n'est guere chargée
de matiere ou de partie sulphureuse c'est ce qui fait aussy que Les sels de
cette serosité quoy qu'ils en font s'emportent vivement quoy que considerable
parce qu'ils sont debarassés des souffres cette rempli matiere qui remplit
Les vessies estant fort careuse elle suppose un sang aussy de meme et estant
chargée de beaucoup de sels et de peu de souffres celle marque aussi
que Les sels abondent dans le sang comme lorsqu'il est fondu et Les
souffres en estant chargés ils Laissent separer pelle mele plusieurs
sels qui n'ont pas encore fermenté dans la vessie et cela peut bien
augmenter la demangeaison et dissiper toute L'humeur
Dans la grosse galle les pustules se crevent ou bien elles se desseichent

Et deviennent blanche comme la petite verolle lors qu'elles viennent
creuvent d'elles mesmes elles viennent de la vapeur de l'humeur qui est au dedans
elles se dessechent parce que l'humeur dont elles estoient remplies
se desseche elles deviennent blanches parce qu'il y a dedans une
humeur blanche

L'humeur qui remplissoit les vessies s'epaissit ou parce que sans changer
de quantité et sel grossier et de souffre en ayant fermenté du
temps que la partie volatile estant s'evaporoit ou bien
c'est la limphe qui s'est amassé hors des petits conduits qui portent
la nourriture aux filets de la peau qui sont rompus ou a la superficie
meme ou bien le sel ayant rompu quelques fibres de la peau. Le
sang s'extravase et contribue en partie ce qui est fort vraisemblable
car cette matiere ressemble fort au pus et lors qu'on presse un peu la peau
on voit sortir de goutte de sang ou bien enfin l'humeur s'epaissit
parce que la fermentation qui s'estoit excitée a fait dissiper les
partie les plus subtiles et apres la fermentation le mouvement sensible
des parties insensibles estant diminué parce que la fermentation a cessé
la liqueur doit perdre sa fluidité or cette humeur fermente parce
qu'elle contient quelques sel parce qui nourrissent fermente au
au passement car quoy que generallement parlant les excremens
de nostre corps sont de sels parfaits qui ont desja fermenté cependant
le mouvement de la nature ne peut pas estre si reglé qu'il ne s'en trouve
mele avec les sels de acides et alkalis qui s'y en ayant fermenté
apres et s'il arrive ...... quelle s'en beaucoup sans avoir pris
aucune peine on se trouve fort abattu parce que les sels fermentés
du sang qui doivent entretenir la fermentation dans toutes les parties
se sont attrapés par les glandes miliaires avec la matiere de la sueur

Cette humeur qui remplit les vessies s'endurcit en croutes
ce qui marque qu'elle estoit chargée de beaucoup de souffre mais comme on
sent une demangeaison considerable et que la peau qui est dessous
demeure elevée il faut qu'il y ait aussi beaucoup de sel d'autant
plus grossier et corrosifs qui sont enveloppés de parties sulphureuses
et par consequent qu'ils doivent avoir plus de masse et d'activité
pour se faire sentir apres avoir lavé cette croutte il en vient une
autre nouvelle. si la demangeaison en continue parce qu'il
y a un sale semblable au... qui est tousiours fourny par le bord
du corps muqueux de la matiere qui vient des glandes miliaires
qui sont placées sous cette vessie se mele encore et se fermente
avec l'humeur qui se trouve dans la vessie et la rendant plus
corrosive qu'il doit exciter une demangeaison de plus les glandes
des bords du corps muqueux autour de l'endroit ou se formoit
la vessie estant gonfleés il est de necessité que leurs pores souvent
se deviennent plus grands ils laisseront passer de sel et de souffre
grossiers qui faisant des croutes et excitant de demangeaisons
La matiere qui sort de dans le corps muqueux estant donc visqueuse
dans cette espece de galle elle suppose un sang de meme nature et estant
encore saline le sang le sera aussy ainsy tout ce que rendra le sang
epaix et salin contribuera a produire ce mal telle sont la peau
la tristesse l'oisiveté, l'air crasse et humide et principallement les viandes
salées et epaisses et les vins verts

Cette maladie est fort incomode mais elle na aucun danger
elle est quelque fois critique parce que les sels grossiers et etrangers de la masse du sang
les

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

ACADÉMIE ROYALE CHIRURGIE C

produisent par elever aux liquer qui fermentent dans le sang jusques a ce quils deviennent entierement et si dans ce cas on vient a guerir la galle par des remedes externes sans les interieurs on tombe souvent dans des tours qui aviatre des fleuresie apoplexie &c parce que le sale grossier ne pouvant se vuider de sang par ces petits eleves il fait des fluxions sur differentes parties les galle cainne, passent en peu de temps mais les autres galles sont assez opiniatres et ne cedent que difficilement aux remedes parce quelle suppose un mauvais fonds dans la masse du sang

pour guerir ce mal il faut commancer par la saignée ensuitte si cest une galle cainne il faut purger de la sorte

4. sen. mund. ℥ii infund. in s. q. aq. font. in colat. dissolu. mann. calabrin. ℥ii. velent. extrait. a ℥iii f pot.

Apres avoir purgé doucement comme le sang est fort salin et acide il ne faut donner aucun remede qui puisse le irriter et ainsi on sattachera uniquement aux delayens et inviscens ce pourquoy on donnera les bouillons raffraichissans avec la chicorée la buglose et laitue on y mettra aussy de la racine de lapactum acutum et de la fumeterre affin de briser les sales du sang pour leur faire prendre cours dans les urines apres les bouillons on viendra au petit lait et ensuitte au lait entier dont il faut user pendant longtemps parce que les constitutions du sang sont difficiles a retablir

Si cest une grosse galle apres avoir saigné on donnera la purgation avec lhelebore noir prescrit dans le chap. des dartres ensuitte il faut penser dattenuer et de diviser et dattenuer les sels grossiers de briser la tissure epaisse et ferme de souffre de volatiliser un peu le sang affin que la matiere de la transpiration prenne son cours ordinaire on commancera donc par le bouillon aperitif affin de vuider une partie de sels grossiers par lurine on viendra ensuitte a lopiatte dacier et dela on passera aux bouillons de vipere quil faut prendre pendant longtemps car cette constitution du sang est difficille a changer et il ne faut pas rebuter si au commancement des remedes les galles incommodent plus elle vient simplement de ce que lon donne du mouvement au sang et davantage les sels de la transpiration qui se jettent dans les eleves en aug mentent la demangeaison au lieu que cette demangeaison et le ... ... qui arrivent dans les dartres viennent de ce que la matiere de la transpiration estant abondante elle ne peut pas passer ... ... du corps muqueux soit par que ces cellules sont chargées a present soit par ce que les canaux ne sont pas assez larges ainsi elle gonfle les glandes du corps muqueux parce quelles sont dun tissu fort lache et tendre elles pateront aisement et leurs fibres s'ecarteront jusqua laisser passer cette matiere de la transpiration qui picotera et irritera les fibres de la peau voisine au lieu que la matiere qui fait cette dans les glandes milliaires ou les autres ne se jettent pas parce que le tissu de la glande est trop ferme pour la laisser passer

atraueser pour aller picoter le partie voisine elle ne peut pas piquotter la glande meme parce que lauteur de la nature sagement prevoyant tel rapport entre les figures des sels et le tissu de la glande qui doit separer quil ne sauroit jamais lirriter ainsi la cantarides ne irrite pas les conduits salivaires mais elle blesse bien la bouche la bile ne picotte pas le vesicule du fiel mais elle ronge les intestins et toutes ces pointes demangeaisons quon sent dans la peau ne viennent point du sel grossier qui se sepáre dans les glandes miliaires mais de celuy qui se separe dans le corps muqueux et passant atrauers les fibres des cellules dureux sont irrités La peau on trouvera lavoir expliqué des tous les remedes [illegible] auxquels elle a beaucoup de rapport

pour ce quy est des remedes externes comme nous avons dit en parlant des autres il ne faut pas sen servir quapres avoir auparavant usé des remedes internes la 1re chose quon doit faire cest de se baigner souvent pour donner un libre passage a la matiere de la transpiration en relachant le tissu de la peau leau de bain laue aussi et nettoye les bleves des sels mais si la saison nest pas pour le bain on doit lhuile de fleurs desureau jusqua pres lusage des autres remedes le meilleur remede externe pour la galle cest le souffre commun parce quil ferme le sel de la transpiration et diminue son ammoniac et par son souffre il embarrasse les memes sels on fera bouillir un peu de souffre dans lhuile jusques a ce que lhuile devienne un peu rouge et lon se frottera de cette teinture dans tous les endroits qui sont atteints de la galle mais il faut se tenir bien enfermé quand quoyqu'on en use parce que lhuile bouchant les pores si le froid les frappoit encore davantage il auroit danger de faire rentrer sur le poulmon ou quelque autre funeste accident on peut se servir de longuent suivant

℞ pulp. præd. ℥vi ung. neapolit. ʒii ung. pomat. ʒi flor. Benz. vel storac. ʒiii f. ung.	℞ radic. enul. Camp. vel lapat. acut. ℥vi pomar. ℥ii coq. in s. q. aq. font. ad putrilaginem usq. pulp. traiect. ℥iv add. flor. sulphur. succ. limon. et unguent. rosa. (+ pomati.) ãa ℥i cum bonum odorem flor. benzoini vel storacis ʒiii f. ung. quo illin[atur]

mais si la gale sopiniatre orque les ulceres soint un peu profonds on employera longuent cy a coste

Pendant lusage de ces onguents il faut se bien garantir de saprocher de lair froid parce que ce le mercure entre dans longuent deneapoleitain agite le sang il forme quelques sels de la transpiration et si par le froid ils estoint retenus dans le sang il le faudroit et faire une apoplexie ou une fluxion sur la poitrine ou rumatismes [illegible] ou bien et cet onguent nen porte pas entierement le sel

Par bleves a la place de longuent neapolitain on mettra deux onces de farine folle farine qui se trouve au col du matras ou l'on fait le sublimé doux parce que son sel aubelle corrige l'antimoine du sel du diviné rouge aussy les petits chairs fongueuses qui se trouve dans ces bleves et qui entretiennent quelques pour le guerir de la galle se frotant avec de tabac mais c'est un mauvais remede car il produit souvent quelques parties de la peau a dartres et il ne faut lord. qu'aux paisans et gens robustes suppose qu'on ne puisse pas avoir aisement les autres remedes

Apres que les bleves sont tous gueris il est bon de se baigner souvent affin de relacher la peau et d'ouvrir les pores qui y seroient restes bouchés pour le remede qu'on employe on relachant aussy le corps muqueux on le rend propre a faire sa fonction

article 12°

Des tumeurs flateuses

outre les quatre tumeurs generalles et leurs differentes especes dont nous avons parlé il y a des tumeurs flateuses qui une espece differente comme nous dirons dans la suitte

Cette tumeur dont leve considerablement la peau et lorsqu'on la presse avec le doigt elle ne fait point de resistance mais elle cede mesmes facilement que les trois autres tumeurs et lorsqu'on leve le doigt l'impression ne reste pas mais la partie revient avec vitesse et elasticité a son premier etat

Pour ce que nous venons de dire il est certain que cette tumeur vient de l'air puis qu'il n'y a que l'air qui puisse donner cette souplesse et elasticité a la partie or l'air ne peut venir dans le tissu de la peau ou sous la peau ou par les muscles par le dehors puisqu'il n'y a point d'indication de l'abitude du corps par où l'air puisse entrer il faut qu'il y vienne de dans or il n'y a dans nostre corps que le sang qui vienne aux parties il faut donc que cet air soit venu du sang pendant qu'il est dans la condition naturelle puis qu'on ne remarque aucune goutte d'air qui y puisse s'amasser pour faire cette tumeur et que cela n'arrive pas naturellement il faut donc que ce soit la fermentation ord. qui ait donné lieu a cette collection d'air en effet nous voions tous les jours que des liqueurs qui fermentent produisent des vens et la fermentation extra du sang produira ce effet venendo mais aux petit molecules d'air qui contiens l'occasion de se rencontrer et de s'unir pour faire cette tumeur et en effet nous devons pas douter que le sang ne contienne de globules d'air puisque les corps solides que nous mangeons en contiennent dans leurs pores et qui estant dissous par la fermentation que ces corps souffrent dans nostre estomach et dans les intestins et sont dans intim. avec le chile et passe dans le sang l'air aussy

Et Les autres liquides que nous voyons continuellement b... ce qui
ne vient que de La rarité de lair qui est y contenu ou bien la
fermentation extraord.re et bisarre du sang donne ouasy a cette
collection de lair parce que par cette fermentation extraord.re
Le souffre se rarefiant et se brisent en sont des filamens qui
sattachent et sunissant ensemble font un corps fort rarefie
et elastique semblable a lair qui environne notre corps
avec cette difference quil nest pas chargé de ses vapeurs
qui sexhalent de differens corps qui sont latmosphere ce qui nest
pas essentiel a lair quil souffre de notre corps se raréfiant et
se chargent puise forme de globules dair cella est conforme
parceque Lor Largent et Les autres corps Les plus dargent le
dissolvent forment touziours de lair comme on peut bien voir
si on Le met a fermenter dans la machine de boile nous voions
aussy que Lors que Le vin ou Les autres Liqueurs semblables
fermentent il se leve quantité de balles de bulles dair qui se
changent en ecume qui samassent sur la liqueur et cet ecume marque
que les bulles ne sont que des filamens de souffre qui se sont fait
pendant La fermentation et cest la cause La plus probable
de la formation de lair dans certaines tumeurs de
ces sortes de tumeurs sont quelque fois avec rougeur et
inflamation et cest alors meme que le sang meme qui ferment avec
violence produit lair quelque fois elles sont blanches et procede
de la oedeme et cest la serosité ou la limphe qui estant chargée
de quantite de sels heterogenes fermente rudement et produit lair
Le prognostic de ces tumeurs est pour lord.re facheux non pas
a raison de la tumeur meme mais elle est fort mauvais signe
dans les fievres malignes elle occupe quelque fois tout le
corps et elle est touziours dune fort mauvaise augure parce
qu'elle marque une fort grande fonte et fermentation du sang elle
se trouve aussy souvent avec Lerisypelle et le charbon et est alors
une fort mauvaise marque par les memes raisons que dans les fievres
malignes dans les filles et aux maladies des enfans elle menace
beaucoup parce qu'elle marque une grande fermentation et quantité de sels et que le
tissu du sang des enfans est fort foible et tendre il est a craindre qu'
ne le fonde entierement Monsieur Chirac a souvent observé
que dans ces cas les malades sont morts lors qu'elle est avec rougeur elle
est aussy a craindre lors quelle est erisipelateuse il ny en a quelqu'elle
qui vient dans quelque partie sans aucune maladie qui est sans
danger parce questant produite par Le hazard qui a fait rencontrer
des sels heterogenes dans quelque partie et ne suposant aucun mauvais
estat dans la masse du sang nest pas a craindre
Pour guerir cette tumeur si elle est avec fievre maligne co.e dans ce cas
elle est presque toujours elle ne demande autre curation que celle de la
fievre maligne et Les remedes doivent estre les memes que dans
Lerisipelle et le charbon mais plus actif si elle les accompagne
si cette tumeur com.ce par un oedeme et quelle soit sans autre maladie
elle demande les memes remedes qui sont descripts

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C... N...

Dans le chapitre de Lerisipelle car quoy que ce soit un souffre deja echauffé qui produit cet air cependent comme les filamens de souffres sont un peu grossiers et s'acrochent ensemble il sont des fleurs quy soutiennent cet partie elevée il faut inciser et diviser ces filamens pour qu'il transpirent ou se remelent avec le sang de ... ou de l'hyeble qu'on arrouse avec l'esprit de vin et le sel armoniac y reussit parfaitement le corps chauds y sont aussi fort utilles comme les briques &c. parce que par leur chaleur ils rarefient et attenuent et puisent ses filamens de souffre et en irritent tuement la peau lu font ressors pour comprimer l'air et l'obliger aussi a transpirer ou a se meller avec le sang.

ACADÉMIE DE CHIRURGIE N

Art 13.
Du Cancer

Le cancer est une tumeur au commencement dure et indolente dont la surface est inegalle et les veines sont toutes variqueuses les unes sont noires les autres d'une couleur plombée elle s'attache dans la suitte avec les parties quy sont au dessous et elle devient douloureuse la douleur est lancinente et tres cruelle la tumeur devient d'un rouge un obscur elle s'ouvre par une crevasse la chair se boursoufle par la crevasse et s'eleve beaucoup

De ce que la tumeur est dure il faut qu'elle soit produite par la limphe comme nous avons dit en parlant du skirre avec lequel le cancer a b[eaucou]p de rapport et de ce que il se trouve ordinairement aux mamelles a l'aisselle aux parotides ou a raison de ce que la lymphe a son siege ordinaire est dans les glandes et par consequent l'humeur quy est arretée et endurcie pour former le cancer dans les differentes parties du corps sera analogue a l'humeur qui se separe ord[inaire]ment par ces glandes ainsi le cancer qui se trouve aux mamelles sera formé par une humeur dans les femmes analogue a celles des moines et dans les hommes a celles de transpiration l'humeur quy forme le cancer des parotides sera semblable a la salive &c. mais de ces humeurs sortent insensib[lemen]t et tranquillement dans son couloir elle ne distend pas avec assés de violence p[ou]r pouvoir exciter une douleur et la peau de tension qui envelope a la glande ou la peau avec la dans ... lequel la dispose a preter plus facilement le lendemain sans aucune violence ainsi la tumeur croitra jusqu'a une grandeur prodigieuse sans quon y sente aucune douleur adjoutte que comme les matieres qui fait cette tumeur est fort epaisse et fort dure elle comprime le canal des petits nerfs qui se trouvent dans la partie et comme elle a interromp le cours des esprits dans la tumeur il s'ensuit qu'elle ne doit [estre] pas douloureuse parce que la com[unicatio]n qui se trouvoit auparavant entre cette partie et le cerveau ne subsiste plus mais si la limphe ne s'arretoit dans son couloir que parce que son souffre estoit plus grossier et son souffre n'estoit grossier que parce q[u'il] est coagulé par un acide ou uni avec des sels fixes et grossiers il s'ensuit que l'humeur qui [fait] la tumeur doit estre bien chargée de sels de plus quoy q[ue] la limphe soit fort bien constituée elle ne sauroit s'endurcir que les parties aqueuses ne soint dissipées et par consequent ces sels doivent grossir et se cristalliser ensuittant

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

aun lu peu de souffre parce quil ny avoit assez deau pour les
tenir en dissolution il sensuit aussy delamatiere qui est empreinte
doit estre fort chargee de sels grossiers et se cristallise et cest
cancer attaquent ordinairement les melancoliques bruler dont le sang est fort
salin et charges dequine de sels grossiers et fixes delanature de
leau regale il faut que dans le cancer que tout ce quil yavoit daqueux
et de tenu soit evaporé qui yait quantité de sel grossiers et corrosif
par ce qui sont a sec. car il faut retomer deltharthere qui fait le cancer
demesme que la solution du sel detartre desprits de nitre et les qualités
qui ya beaucoup deau ne font aucune impression facheuse sur notre
corps mais amesure que leau sevapore le sel se font sentir en
grossissant jusque apouvoir rongever dissoudre entierement la
substance de notre corps on ne sauroit donc douter que la matiere
qui fait le cancer ne soit composée de sels grossiers et cristallises
avec quelque partie de souffres si donc ces sels viennent a estre en
mouvement par quelque cause que ce soit il ne manqueroit pas
diriter et de ronger considerablement la partie pour y exciter la douleur
et cest selle se mettront en mouvement a locasion des secousses que le sang
des arteres et des veines leur font continuellement lesquelles font
detacher de tems en tems des molecules de sel qui exitent la douleur
lancinante ou bien les sels se degageront par les sels volatiles
qui transpirent du sang voisin qui dissolent la matiere endurcie et
mettant les sels en feu quelques fois meme le cancer qui est ouvert est sans
douleur et alors la matiere du cancer en enti endurcie et devenue
delanature dela corne. de sorte que les nerfs sont entierement
comprimer et bouché
Comme les glandes qui sont attaquées se gonflent beaucoup elle ne
manque jamais de comprimer les rameaux des veines qui la
traversant ou qui passent aucoté la cavité. des veines estans ainsi retressis
le sang ne peut pas passer a la quantité ordinaire de sorte quil en oblige
de raiallir en quantité dans les capillaires de la peau et les dilatent
beaucoup le fait paroistre fort gonflé et comme la tunique de la veine
et la cuticule tres peu de transparence les veines engorgees
paroissent noires et d'une couleur plombée suivant que les parties
etrangers d'une certaine façon les raisons de lumiere qui sont reflechis du sang
La superficie du cancer est inegalle par plusieurs raisons 1.ment 1.co
les glandes et principalement les conglomerées sont des paquets de
vaisseaux entassés les uns sur les autres il ne sauroit se gonfler
et se remplir considerablement sans selever plus dans quelque endroit
que dans d'autres et par consequent la peau qui saccomode a leur figure
doit estre inegalle.
2.o une glande en se gonflant comprime une autre glande et lempeche
de croistre
3.o il se peut faire que la matiere qui gonfle la glande laisse
passer une serosité atravers le tissu de la glande et que une
serosité ou lymphe samasse autour des glandes par lembarras
qui arrive aux cours des humeurs a locasion du gonflement des glandes
et cette serosité ou lymphe venant a sendurcir jnegulierement
sur le dehors des glandes fait elever la peau jnegulierement

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE